

FIPROTEC 50 mg Spot-On oplossing voor katten. Fipronil.

1 pipet van 0,5 ml bevat:

Werkzaam bestanddeel: Fipronil 50 mg

Hulpstoffen:

Butylhydroxyanisol (E-320).....0,100 mg

Butylhydroxytolueen (E-321).....0,050 mg

Benzyl alcohol (E-1519).....142,500 mg

Heldere, kleurloze tot gelige oplossing.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS:

Kat, vanaf 1kg lichaamsgewicht en een leeftijd vanaf 8 weken.

INDICATIE(S): Behandeling en preventie van vlooiëinfestaties (*Ctenocephalides felis*) bij katten. De beschermingsduur tegen vlooië infestatie is 5 weken.

Behandeling van tekeninfestaties (*Ixodes ricinus*). Teken (*Ixodes ricinus*) die op het moment van toedienen aanwezig zijn op het dier, zullen binnen 48 uur gedood worden. Behandeling beschermd niet tegen nieuwe tekeninfestaties.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN): Alleen voor uitwendig gebruik. De pipet pas uit de originele verpakking halen op het moment van toediening. Toedieningsweg –Topicale toepassing op de huid.

Dosering: 1 pipet van 0.5 ml per kat.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN): Lees de informatie aan de binnenkant van het doosje vóór elk gebruik voor volledige instructies en alle waarschuwingen, inclusief gebruikerswaarschuwingen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Direct gebruiken na opening. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit geneesmiddel. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum op het label. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Fipronil kan waterorganismen nadelig beïnvloeden. Dit diergeneesmiddel of lege containers dienen niet in vijvers, de waterloop of sloten terecht te komen.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. VRIJ

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Houd de pipet rechtop. Tik zachtjes tegen het nauwe deel van de pipet om alle vloeistof in het dikste gedeelte van de pipet te laten vloeien. Knip het topje van de pipet af met een schaar. Duw de vacht tussen de schouderbladen opzij totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de punt van de pipet op de huid en knijp de inhoud van de pipet op de huid, het liefst op 2 plekken, een achter op de kop en een 2-3 cm naar achteren. Voorkom dat de haren overmatig nat worden na toediening, omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de toedieningsplaats. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Inhoud: 3 x 0,50ml

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren.

CONTRA-INDICATIES: In de afwezigheid van beschikbare gegevens, het diergeneesmiddel niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens/katten die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN: Indien het diergeneesmiddel opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof. Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen werd overmatig speeksel, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen), braken of respiratoire tekenen waargenomen na gebruik. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Voor een optimale controle van vlooiëninfestaties in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten in het huis behandeld te worden met een geschikt insecticide. Vlooiën van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan ook in geval van een massale vlooiëninfestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen. Voorkom regelmatig laten zwemmen of het wassen van het dier met shampoo aangezien de handhaving van de effectiviteit niet is getest in deze gevallen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van accidenteel contact met de ogen, spoel deze dan onmiddellijk grondig met water. Het dier moet voor behandeling nauwkeurig worden gewogen. Het is belangrijk het diergeneesmiddel aan te brengen op een plaats waar het dier het niet af kan likken. Laat dieren elkaar niet aflikken na behandeling. Er kan een aanhechting zijn van enkele teken. Om deze reden kan een overdracht van besmettelijke ziektes van de teek op het dier niet uitgesloten worden. Gebruik het diergeneesmiddel niet op wonden of beschadigde huid. Gebruik het diergeneesmiddel niet bij niet-doel-diersoorten, vooral niet bij konijnen en cavia's. De potentiële toxiciteit van het diergeneesmiddel voor kittens jonger dan 8 weken oud in contact met een behandelde poes is niet gedocumenteerd. Extra opletten is nodig in dit geval. Niet gelijktijdig gebruiken met andere vlooiënmiddelen die direct op het dier worden toegepast.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot aan gebruik. Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of een van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het diergeneesmiddel met de mond en ogen worden vermeden. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen voorzichtig met schoon water te worden gespoeld. Inname van het diergeneesmiddel is schadelijk. Voorkom dat kinderen toegang hebben tot de pipetten en gooi gebruikte pipetten direct na toediening weg. Behandelde dieren moeten niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen moeten niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen. Het diergeneesmiddel kan nadelige effecten hebben op geveerde, gelakte oppervlakten of andere oppervlakten in huis of op meubilair. Niet roken, drinken of eten tijdens toediening. Handen wassen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren.

Overdosering: Het risico van bijwerkingen kan toenemen bij overdosering. Jeuk kan voorkomen na behandeling.

Overdosering zal er voor zorgen dat er een kleverige plek ontstaat op de toedieningsplaats. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN:

Junii 2016

OVERIGE INFORMATIE: 3 pipetten verpakt in een kartonnen doos.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:

REG NL 113133

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Laboratorios Calier, S.A. Barcelonès, 26 – Pla del Ramassà
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona, Spanje
Tel.: +34 93 849 51 33, Fax.: +34 93 840 13 98,
e-mail: laboratorios@calier.es

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3, 8101 BX, Raalte, Nederland
T: +31 572 348 834
F: +31 572 348 835
hqb@beaphar.com

DISTRIBUTEUR:

Beaphar Nederland BV,
Baronieweg 7,
5321 JV Hedel, Nederland

www.beaphar.nl